Comment éviter

Pour eviter le paludisme, il faut :

- dormir sous moustiquaire imprégnée.
- mener des activités d'hygiène et d'assainissement pour éviter la multiplication et le développement des moustiques. Pour cela il faut :
- detruire les gites de reproduction du moustique (boîtes de conserve vides, pneus usagés, etc...)
- éviter la formation de flaques d'eau surrout pendant l'hivernage,
- élaguer les arbres et désherber les alentours des maisons, etc...

Pour la femme enceinte, se rendre dans les structures de santé pour prendre son médicament contre le paludisme lors des consultations prénatales.



La piqure de moustique est la seule cause du paludisme





Demandez conseil à un agent de santé

Ne négligeons pas le paludisme



Changeons de comportements...

Les lemmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans sont les principales victimes du paludisme au Sénégal.

Pour les sauver, protégeons-les



LE PALUDISME ...

Ne negligeone pas le paludisme

Le paludierne est la maladie la plus fréquents au Sénégal. Elle est auxsi la maladie qui tue le plus dans notre pays.

Seul le moustique (anophèle femelle) est le vecteur du paludisme et il pique surtout la nuit.


Le paludisme est un problème de santé majeur. À l'échelon mondial, il est à l'origine d'un décès toutes les 30 secondes. Neuf cas sur dix concernent la région africaine, où un million de décès est enregistré chaque année. Au Sénégal, où il existe de manière endémique, le paludisme représente 35 % des motifs de consultation et une personne meurs de paludisme chaque heure. De ce fait, le paludisme constitue la première cause de maladie et de décès dans notre pays.

A titre d'assemple, en 2000° ;

 Sur 3 463 849 malades reçus en consultation, 1 168 396 présentent des signes de paludisme. (34%)



 Sur 96 347 maladas hospitalisés dans les structures publiques, 37584 cas sont dus au paludisme. (36%)





 Sur 3 441 cas de décès enregistrés dans les structures publiques, 2 139 sont imputables au peludisme, (82%).



du Paludisme

Le principal signe du paludisme est la fièvre (corps chaud). Cette fièvre peut aussi s'accompagner de maux de tête et de frissons.

La maladie peut évoluer rapidement et d'autres signes de danger peuvent apparaître, notamment :

- crises convulsives.
- · Incapacité de boire ou de téter
- vomissements répétés.
- · incapacité de se tenir debout ou de marcher
- troubles du comportement (agitation, délires, hallucinations)
- * troubles de la conscience (obnubilation, coma)
- anémie sévère ou pâleur extrême
- ictère (yeux et/ou urines jaunes).

de fièvre ?_

- . Penser d'abord au paiudisme
- Se rendre à la structure de santé la plus proche en enveloppant l'enfant dans un lings humide (serviette, draps, pagne ...)

les conséquences du Paludisme

Le paludisme peut tuer très reputament un enfant de moins de cinq uns ou entraîner des conséquences graves pour le reste de se sie.

Le paludisme est dangereux peur le femme anceinte.

Il peut provoquer une fausse rouche, le naissance d'un enfant mort-né, un petit poide du bébé à la naissance, une anàmie pour la mère, la mort.

De plus, le paludisme entraîne un absentaisme scolaîre, une baisse de la productivité et contribue de de fait à l'apprevation de la passveté.